

RUPTURE PRESERVATIF

Votre capote a cassé? Pas de panique voici une solution pour limiter les risques d'infection

Petits conseils après la rupture de capote:



- Aller uriner pour faire sortir le sperme du vagin et pousser assez fort pour le faire sortir de l'anus



- Ne vous lavez pas l'intérieur du vagin ou de l'anus et ne chercher pas, avec vos doigts, à faire sortir le sperme: vous risquez de fragiliser les muqueuses et d'augmenter le risque de transmission



- Dans les 48h maximum qui suivent la rupture vous pouvez aller aux urgences de l'hôpital le plus proche pour bénéficier d'un Traitement Post Exposition. Attention, plus vite vous y allez et mieux c'est !



- Le TPE est un traitement médical qui essaie d'empêcher la contamination par le virus du sida. C'est un traitement qui dure un mois et qui sera sûrement lourd mais il est important d'aller jusqu'au bout.

Si vous n'avez pas pu aller à l'hôpital il faudra attendre 15j à 3 semaines pour faire un test de dépistage.

Pour éviter toute grossesse non désirée vous avez 72h pour prendre la pilule du lendemain disponible en pharmacie (gratuite sur prescription)

**Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche
alors n'hésitez pas à nous contacter!**

